

Läkemedelsinformation sammanställd av Apotekare [Maria Strinnö](#), Sjukhusapoteket i Falun, 1991. (Fakta granskat av Överläkare P-J Hedin, 2003-03-22)

VARFÖR SKA JAG TA PENICILLAMIN? Din läkare har ordinerat penicillamin mot Din reumatiska sjukdom. Det är en medicin som på lång sikt kan minska sjukdomens inflammatoriska aktivitet och därmed lindra t ex stelhet och värk.

VAD ÄR PENICILLAMIN? Penicillamin är en avlägsen släkting till penicillin men har själv ingen verkan mot bakterier. Penicillamin används framför allt vid reumatiska sjukdomar, främst kronisk ledgångsreumatism. Vid ledgångsreumatism aktiveras olika typer av celler som utsöndrar skadande ämnen. Dessa startar den reumatiska inflammationen. Penicillamin begränsar denna process. Medicinen tillhandahålls på licens.

HUR LÅNG TID TAR DET INNAN MEDICINEN FUNGERAR? De patienter som har nytta av penicillamin känner som regel efter 2-3 månader en förbättring. Det kan dock ta både kortare och tyvärr ofta längre tid.

HUR MÅNGA TABLETTER SKA JAG TA VARJE DAG? Det är mycket viktigt att ta tabletterna precis som Din läkare har ordinerat. Behandlingen brukar börja med 1 tablett per dag. Penicillamin ska intas på fastande mage 1 timme före eller 2 timmar efter maten (gäller även intag av andra läkemedel). Eftersom penicillamin binder till vissa metaller, bl a järn och kalcium som finns i mat, kommer delar av dosen annars att försvinna ut ur kroppen tillsammans med metallerna, i stället för att tas upp. Genom att ta tablett till natten minskar Du risken att känna av obehag från magen.

HUR LÄNGE SKA JAG TA PENICILLAMIN? Efter hand som behandlingen fortskrider kan dosen komma att ändras. Din läkare provar ut vilken dosering som är bäst just för Dig. Så länge tabletterna hjälper och Du mår bra kan Du fortsätta att ta medicinen.

FINNS DET NÅGRA BIVERKNINGAR AV PENICILLAMIN? Liksom alla läkemedel så kan penicillamin även ge oönskade effekter. De vanligaste biverkningarna är magbesvär samt hud- utslag. Lindriga, ibland kliande hudutslag kan dyka upp, ofta i början av behandlingen, och försvinna av sig själv utan att behandlingen behöver avbrytas. Ibland upplevs metallsmak i munnen, eller försämring av smaksinnet vid behandling med penicillamin. Detta brukar dock vara övergående. Allvarligare men mindre vanliga biverkningar är påverkan på blod eller njurar. När Du behandlas med den här medicinen får Du hela tiden regelbundet ta blod- och urinprover samt gå på kontroll hos Din läkare. Dessa prover tas för att följa upp behandlingens effekt och tidigt fånga upp eventuella biverkningar. Det är viktigt att Du kontaktar Din läkare om Du märker feber eller andra symtom som Du misstänker beror på medicinen.

KAN JAG TA ANDRA LÄKEMEDEL TILLSAMMANS MED PENICILLAMIN? Du ska fortsätta att ta Dina övriga mediciner så länge din läkare inte säger något annat. Det är dock viktigt att Du talar om vilka andra mediciner Du använder. Det gäller även sådana som inte är mot den reumatiska sjukdomen, och sådana som Du inte köpt på apoteket utan i hälsokostaffär eller i snabbköpet.

HUR OFTA BEHÖVER JAG GÅ PÅ KONTROLL? Du träffar regelbundet Din läkare under hela behandlingsperioden. Prover tas efter ett bestämt schema.

GRAVIDITET OCH AMNING? Penicillamin ska inte användas vid graviditet och amning.

NÅGRA ANDRA FRÅGOR? Tveka inte att fråga Din doktor om det är något Du undrar över.